



INFORMACJA ORGANIZACYJNA

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Przygotowanie do KOLONOSKOPII

Na 7 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku, a także pieczywa z ziarnami.

Na 48 godzin (2 dni) przed badaniem należy stosować dietę ubogoresztkową: zupy klarowne, bulion, ryż, makaron, gotowane mięso, przecedzone soki, herbata, niegazowane napoje, kisiel, budyń, jajka na miękko. Osoby z zaparciami taką dietę powinny stosować już na 72 godziny przed badaniem.

Na 24 godziny przed badaniem

- pacjent pozostaje na diecie płynnej (można pić dowolną ilość wody niegazowanej);
- około godziny 16.00 w dniu poprzedzającym badanie należy rozpocząć przyjmowanie preparatu FORTRANS, rozpuszczając 1 saszetkę preparatu w 1 litrze wody. **Przygotowany roztwór należy wypić w tempie 1 litr na godzinę.**
- w dniu badania można przyjmować płyny do 6 godzin przed wyznaczoną godziną badania.
- w indywidualnych przypadkach sposób przygotowania do badania ustala lekarz.

NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ: sałatek, warzyw, owoców, mięsa i ryb z sosami, kielbasy, mleka, tłuszczów, kawy i gazowanych napojów

Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.

Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszej pracowni.

Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, sintrom, ticlid lub aspirynę, acard, acesan, bestpiryn i inne) powinny przerwać ich stosowanie na co najmniej 7 dni przed badaniem, **należy to jednak skonsultować z lekarzem prowadzącym.** Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę drobnocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane). Informacja o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego będzie zawarta w karcie wypisowej.

Kobiety ciężarne i matki karmiące powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.

Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki na stałe przyjmowanych przez siebie leków. Po badaniu w znieczuleniu ogólnym pacjent przebywa na sali pod obserwacją lekarsko - pielęgniarską około 2-3 godziny; po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu. Obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz picia alkoholu.

W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym. Prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.

Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.

Przygotowanie do GASTROSKOPII

Na 6 godzin przed badaniem należy pozostać na czczo i nie przyjmować żadnych płynów.

Jeżeli gastroscopia wykonywana jest w godzinach popołudniowych, pacjent może spożyć lekkie śniadanie, nie później niż do godziny 6.00-7.00 rano. Badanie wykonywane w godzinach rannych powinno odbywać się na czczo.

UWAGA! Jeżeli badanie jest planowane w godzinach popołudniowych należy przyjąć rano leki nasercowe i na nadciśnienie popijając niewielką ilością wody.

Dokumenty obowiązujące do ustalenia badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii:

- dowód osobisty;
- skierowanie z Poradni lub od lekarza rodzinnego, zawierające dane: imię i nazwisko; nazwa pracowni; rozpoznanie KOD-ICD-10; dane lekarza kierującego; pieczętka jednostki kierującej; aktualny dokument ubezpieczenia.

Kontakt do Pracowni Endoskopii

Możliwość telefonicznej rejestracji w dni robocze od 7.10 do 9.10.

W związku ze specyfiką pracy Pracowni Endoskopii oczekujący na rejestrację zobowiązani są zgłosić się personelowi i oczekiwać na wezwanie.

Tel. kontaktowy 15 864 85 71.